

بارداری و زایمان و بیماری های زنان

۱- کدام یک از موارد زیر در مورد لیبر صحیح است؟

- الف) در تعریف جدید ACOG لیبر فعال در دیلاتاسیون ۶ سانتی متری آغاز می شود.
ب) مرحله نهفته طول کشیده در زنان نولی پار در حدود ۱۴ ساعت است.
ج) چاقی مادر، مراحل اولیه لیبر ۱-۲ ساعت طولانی تر می کنند.
د) ترس مادر ۱۵-۴۵ دقیقه طول لیبر را کاهش می دهد.
✓ پاسخ: گزینه الف.

۲- کدام یک از جملات زیر در خصوص مراقبت های دندانپزشکی در بارداری صحیح است؟

- الف) درمان بیماری پرپودنتال در بارداری از بروز زایمان پره ترم جلوگیری می کند.
ب) بارداری کنتراندیکاسیون درمان های دندانپزشکی است.
ج) حاملگی باعث تشدید پوسیدگی دندان می شود.
د) رادیوگرافی دندان در بارداری کنتراندیکه نیست.
✓ پاسخ: گزینه د.

۳- خانمی دچار گسیختگی اپیزیاتومی شده است. همه موارد در پروتکل قبل از عمل برای ترمیم صحیح است، بجز:

- الف) دبریدمان بافت نکروتیک
ب) شستشوی زخم با بتادین
ج) بستن زخم به محض بروز تب
د) آنالژزی یا بی حسی کافی
✓ پاسخ: گزینه ج.

۴- خانمی در شروع لیبر فعال دارای جنینی با قرار عرضی است، کدام یک از تدابیر درمانی زیر صحیح است؟ الف) معمولاً اندیکاسیون برای زایمان سزارین است.

- ب) در صورت پاره شدن پرده ها، چرخش خارجی انجام می شود.
ج) برای انجام سزارین انسزیون عرضی تحتانی ارجح است.
د) با اعمال فشار بر فوندوس، سر جنین به سمت پایین هدایت می شود.
✓ پاسخ: گزینه الف.

۵- براساس ACOG، آمنیوآنفوزیون در کدام یک از موارد زیر توصیه نمی شود؟

- الف) درمان افت های متغیر
ب) پارگی طولانی مدت پرده ها
ج) ابتلا به الیگوهیدرآمنیوس
د) رقیق کردن مایع آمنیون آغشته به مکونیوم
✓ پاسخ: گزینه د.

۶- برای خارج سازی بریج ناکامل، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف) اپیزیاتومی لترال ارجح است.

ب) پس از خروج اندام تحتانی، عامل زایمان، لگن جنین را با دو دست می گیرد و کشش رو به پایین می دهد

ج) برای خارج کردن بازوی گردنی راست، بدن جنین در جهت عقربه های ساعت چرخانده می شو

د) با مانور زاوانلی پشت جنین به سمت سمفیز پوبیس چرخانده می شود.

✓ پاسخ: گزینه ب.

۷- در جریان حاملگی، مسئول هایپرلیپیدمی مادر کدام یک از موارد زیر است؟

الف) افزایش مقاومت به انسولین

ب) تحریک پروژسترونی

ج) کاهش فعالیت لیپولیتیک

د) افزایش فعالیت لیپاز

✓ پاسخ: گزینه الف.

۸- با مصرف روزانه چند میکروگرم اسید فولیک قبل از حاملگی می توان نقایص لوله عصبی را کاهش داد؟

الف) ۲۰۰ (ب) ۴۰۰ (ج) ۶۰۰ (د) ۸۰۰

✓ پاسخ: گزینه ب.

۹- قسمت اعظم افزایش وزن در دوران حاملگی مربوط به موارد زیر است، بجز:

الف) حجم خون (ب) مایع خارج عروقی خارج سلولی (ج) رحم و محتویات آن (د) تغییرات متابولیک

✓ پاسخ: گزینه د.

۱۰- کدام یک از مراقبت های زیر برای زنان ۳۸ هفته مبتلا به IUFD توصیه می شود؟

الف) آنالیز ریز آرایه های کروموزومی (CMA)

ب) جدا کردن فوری نوزاد مرده از مادر

ج) القای الکتیو لیبر در هفته ۴۰ در حاملگی بعدی

د) مصرف روزانه ویتامین E و C در حاملگی بعدی

✓ پاسخ: گزینه الف.

۱۱- کدام یک از موارد زیر در مورد مراقبت های دوره ی نفاس صحیح است؟

الف) در دو ساعت اول، فشارخون و نبض هر نیم ساعت بررسی شود.

ب) گرگرفتگی شبانه بدنبال عفونت نفاسی شایع است.

ج) در صورت بروز پروسیدنشیای نفاسی، کارگزاری پساری مناسب الزامی است.

د) اکثر آسیب های عضلانی با داروهای ضد التهابی و درمان فیزیکی برطرف شود.

✓ پاسخ: گزینه د.

۱۲- مصرف مورد نیاز توصیه شده در کدام یک از مواد معدنی در دوران شیردهی کم تر از بارداری است؟ الف) کلسیم

ب) سدیم

ج) آهن

د) روی

✓ پاسخ: گزینه ج.

۱۳- کلیه واکسن های ساخته شده از ویروس زنده در بارداری ممنوع است، بجز: الف) سرخک

ب) اوریون

ج) تب زرد

د) آبله

✓ پاسخ: گزینه ج.

۱۴- کدام یک از موارد زیر در خصوص مراقبت از زنان سزارین شده، صحیح است؟ الف) خونریزی تا ۲/۵ لیتر را تحمل می کنند.

ب) جویدن آدامس، عملکرد روده را مختل می کند.

ج) در صورت شک به ایلئوس، رادیوگرافی انجام می شود.

د) استفاده از غذاهای جامد، ۲۴ ساعت بعد از جراحی شروع می شود.

✓ پاسخ: گزینه ج.

۱۵- کدام یک از موارد زیر در مورد "واکیوم" صحیح است؟

الف) واکیوم با کاپ مسطح تر، احتمال پارگی پوستی را کم تر می کند.

ب) استفاده از کاپ های فلزی، احتمال سفالوهماتوم را بیشتر می کند.

ج) تنه های غیرقابل انعطاف در وضعیت آسینکلیتیسیم ارجح هستند.

د) قرار دادن قرینه کاپ نسبت به سچور ساژیتال سبب تشدید آسینکلیتیسیم می شود.

✓ پاسخ: گزینه ب.

۱۶- پیگیری STD در افراد تحت خشونت جنسی که درمان پروفیلاکسی دریافت کرده اند، چگونه است؟

الف) تکرار آزمایش STD و بارداری ۲ هفته بعد و پیگیری تا ۲۴ هفته بعد از تجاوز

ب) درخواست آزمایش STD یکماه بعد و پیگیری تا ۱۲ هفته بعد از تجاوز

ج) تکرار آزمایش STD و بارداری ۶ هفته بعد و پیگیری ۲۴ هفته بعد از تجاوز

د) درخواست آزمایش STD سه ماه بعد و پیگیری یک سال بعد از تجاوز

✓ پاسخ: گزینه الف

۱۷- همه گزینه ها در تشخیص و درمان وستیبولودینای برانگیخته (PVD) صحیح است، به جز:

الف) وجود حساس شدگی سیستم عصبی مرکزی و محیطی

ب) احساس درد و سوزش در تماس با ناحیه وستیبول

ج) تجویز استروئید به عنوان خط اول درمان

د) درمان روان شناختی به عنوان خط اول درمان میزان

✓ پاسخ: گزینه ج

۱۸- کدام گزینه در مورد ویژگی سندرم تحریک بیش از حد تخمدان OHSS صحیح است؟

الف) بروز آسیب سفت و هیدروتوراکس در OHSS با درجه ۶

ب) بروز تغلیظ خون و اختلالات انعقادی در OHSS با درجه ۵

ج) افت جدی آنزیم های کبدی و افزایش فشار خون

د) بزرگ شدن دو طرفه و شکنندگی تخمدان ها

✓ پاسخ: گزینه د

- ۱۹- در رابطه با عفونت های تناسلی زنان، کدام گزینه صحیح است؟
الف) آبسه لوله ای تخمدانی به صورت سرپایی با آنتی بیوتیک خوراکی قابل درمان است.
ب) شایع ترین عامل عفونت لگنی در زنان یائسه، گنوره است.
ج) کاهش چین واژن و افزایش پارابازال در واژینیت آتروفیک دیده می شود.
د) درد لگن، تب و خونریزی بعد از مقاربت، نشانه سه گانه ی عفونت لگن است.
- ✓ پاسخ: گزینه ج

- ۲۰- کدام گزینه درباره عوامل خطر سرطان تخمدان صحیح است؟
الف) نوع ارثی آن در زنان مسن تر رخ می دهد.
ب) تعداد زایمان با خطر سرطان تخمدان ارتباط مستقیم دارد.
ج) در زنان کم تر از ۲۰ سال، در ۷۰٪ موارد، تومورهای منشاء ژرم سل دارند.
د) مصرف قرص های ضد بارداری، خطر سرطان اپیتلیایی را افزایش میدهد.
- پاسخ: گزینه ج

نوزادان

۱. اولین دوره هوشیاری نوزاد بلافاصله پس از تولد، معمولاً چند دقیقه طول می کشد؟
الف) ۲۰ (ب) ۴۰ (ج) ۶۰ (د) ۸۰
- ✓ پاسخ: گزینه ب

۲. کدام گزینه در مورد مراقبت از پنیس نوزاد پسر صحیح است؟
الف) هنگام تمیز کردن آلت نوزاد یک روزه، پره پوس به راحتی عقب کشیده می شود.
ب) آلت ختنه شده باید با ملایمت شستشو داده شود.
ج) آلت ختنه شده باید در معرض هوا قرار گیرد.
د) پس از شستشوی آلت، پره پوس باید به عقب کشیده شود.
- ✓ پاسخ: گزینه ب

۳. لمس دو کلیه در نوزاد تازه متولد شده نشان دهنده کدام مشکل زیر می باشد؟
الف) هیدرونفروز
ب) عدم وجود مشکل خاص
ج) مالفورماسیون کیستی
د) نوروبلاستوما
- ✓ پاسخ: گزینه ب

۴. کودکی که هنگام نوزادی تعویض خون شده است، احتمال کدام عارضه در او وجود دارد؟
الف) ترومبوز ورید پورت
ب) افزایش بیلی روبین مستقیم
ج) عفونت ورید نافه
د) افزایش بیلی روبین غیر مستقیم
- ✓ پاسخ: گزینه الف

۵. علائم مرحله تحت حاد در نوزاد مادری که به فنوباربیتال اعتیاد دارد، کدام است؟

الف) تحریک پذیری (ب) بی خوابی (ج) اشتهاى شدید (د) سسکه

✓ پاسخ: گزینه ج

۶. مقدار منیزیم نوزاد مادری که طی لیبر تحت درمان با سولفات منیزیم بوده است، ۲۸ dl/g است. حرکات تنفسی نوزاد کاهش

یافته و خواب آلوده می باشد. اقدام درمانی کدام است؟

الف) تعویض خون (ب) برقراری دیورز (ج) تزریق کلسیم داخل وریدی (د) مراقبت حمایتی و حفظ حمایت تنفسی

✓ پاسخ: گزینه د

۷. همه گزینه ها از مزایای تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله بعد از تولد است، بجز:

الف) ثبات قند خون

ب) کاهش اضطراب

ج) کاهش مصرف انرژی

د) کلونیزاسیون روده شیرخوار با باکتری های محیطی

✓ پاسخ: گزینه د

۸. خانم بارداری با سن حاملگی ۱۶ هفته برای دریافت مراقبت های دوران بارداری مراجعه کرده است، در حال حاضر به کودک ۱۴

ماهه خود نیز شیر می دهد. در چه صورت نیاز به قطع شیردهی نمی باشد؟

الف) کاهش شیر در سه ماهه دوم

ب) سابقه زایمان زودرس

ج) کاهش وزن در طول بارداری

د) خونریزی رحمی

✓ پاسخ: گزینه الف

۹. همه گزینه ها در مورد علت وجود کلافه مو در ناحیه لومبوساکرال ستون فقرات نوزاد تازه متولد شده صحیح است، بجز: الف)

تجمع موهای لانوگو

ب) اسپینابیفیدای پنهان

ج) وجود ناهنجاری زمینه ای

د) وجود مجرای سینوسی

✓ پاسخ: گزینه الف

۱۰. نوزادی که تازه متولد شده است در معاینه اندازه ملاق قدمی اش ۵۰ mm است. کدام احتمال برای او مطرح است؟

الف) میکروسفالی

ب) هایپرتیروئیدی مادرزادی

ج) هیدروسفالی

د) سینوستوز جمجمه ای

✓ پاسخ: گزینه ج

۱۱. هنگام معاینه نوزاد تازه متولد شده در ناحیه سرین و پشت، نواحی پیگمانته آبی مایل به خاکستری با حدود مشخص مشاهده شده است. تشخیص کدام است؟

(الف) تغییر رنگ دلکی

(ب) لکه های مغولی

(ج) موتلینگ

(د) نارسایی جریان خون

✓ پاسخ: گزینه ب

۱۲. در مقایسه گرانولوم بند ناف با پولیپ بند ناف، کدام گزینه صحیح است؟

(الف) گرانولوم به دنبال عفونت شدید و منتشر پایه بند ناف رخ می دهد.

(ب) پولیپ از باقی ماندن مجرای امفالومزانتربیک شکل می گیرد.

(ج) پولیپ با سوزاندن مکرر با قلم نیترا نقره قابل درمان است.

(د) درمان گرانولوم ابتدا با آنتی بیوتیک تزریقی و سپس جراحی است.

✓ پاسخ: گزینه ب

۱۳. نوزاد ترم به دنبال زایمان واژینال گریه نمی کند و تون عضلانی کاهش یافته است. اولین اقدام شما چیست؟ (الف) تعیین نمره

آپگار و تصمیم گیری بر اساس آن

(ب) ارزیابی ضربان قلب، تنفس و رنگ نوزاد

(ج) گرم و خشک کردن نوزاد و دادن وضعیت مناسب

(د) شروع فوری تهویه با فشار مثبت

✓ پاسخ: گزینه ج

۱۴. بر اساس دستورالعمل کشوری برقراری تماس پوست با پوست، همه مراقبت ها صحیح است بجز: (الف) پستان ها قبل از زایمان شسته و تمیز شود.

(ب) نوزاد بلافاصله روی شکم مادر قرار گیرد و یک دقیقه بعد بند ناف قطع شود.

(ج) تزریق ویتامین K و توزین بعد از تغذیه با شیر مادر انجام شود.

(د) مادر و نوزاد بعد از زایمان طبیعی، همزمان و همراه با هم به اتاق بعد از زایمان منتقل شوند.

✓ پاسخ: گزینه الف

۱۵. کدام یک از رفتارهای زیر در نوزاد غیر ارادی است؟

(الف) خیرگی نگاه

(ب) چرخاندن سر

(ج) لبخند زدن

(د) مکیدن

✓ پاسخ: گزینه ج

۱۶. واکنش نوزادی به دنبال سوزن زدن مکرر به پاشنه پا تدریجا کمتر می شود، این چه پدیده ای است و در چه حالتی دیده می شود؟

(الف) خو کردن، در حالت خواب عمیق

(ب) خو کردن، در حالت خواب آلودگی

(ج) بی ثباتی اتونوم، در حالت خواب عمیق

(د) بی ثباتی اتونوم، در حالت خواب آلودگی

✓ پاسخ: گزینه الف

۱۷. به دنبال تهویه با فشار مثبت در نوزاد ترم نیازمند احیاء، ضربان قلب جنین به ۷۵ ضربه رسیده است. اقدام بعدی شما کدام است؟

(الف) تجویز اکسیژن با هود

(ب) تجویز اپی نفرین

(ج) فشردن قفسه سینه

(د) ادامه تهویه با فشار مثبت

✓ پاسخ: گزینه د

۱۸- کدام وضعیت نوزادی می تواند مانع ترخیص زودهنگام نوزاد گردد؟

(الف) تعداد تنفس کمتر از ۶۰ بار در دقیقه

(ب) زردی ۲۴ ساعت اول تولد

(ج) دفع ادرار و مدفوع

(د) حرارت زیر بغل ۳.۳۶ درجه سانتی گراد

✓ پاسخ: گزینه ب

۱۹. کدام گزینه درباره وضعیت ویتامین های نوزاد نارس صحیح است؟

(الف) کمبود ویتامین E در نوزادان نارس بسیار شایع است.

(ب) کاهش جذب چربی احتمالا با کاهش جذب ویتامین D همراه است.

(ج) متابولیسم فنیل آلانین و تیروزین به میزان اسیدفولیک بستگی دارد.

(د) کمبود ویتامین C باعث کاهش سنتز هموگلوبین می شود.

✓ پاسخ: گزینه ب

۲۰- کدام یک از مشخصات نوزاد کم انگيخته "aroused under" می باشد؟

(الف) گرفتگی ب) رنگ پریدگی در دهان ج) ناتوانی در ارتباط د) گریه تسکین ناپذیر

✓ پاسخ: گزینه ج

جنین شناسی

۱- دلیل رقیق شدن موکوس گردن رحم کدام یک از موارد زیر است؟

(الف) افزایش هورمون استروژن

(ب) کاهش ترشح غدد رحمی

(ج) زیاد شدن مایع فولیکولی

(د) کاهش جریان خون سرخرگ های رحمی

✓ پاسخ: گزینه الف

۲- کدام یک از موارد زیر سبب ایجاد تنگی حلقوی (Constriction Ring) در قسمت های مختلف بدن جنین می شود؟

(الف) Umbilical artery Single

(ب) Twin Transfusion syndrom

ج) Fused Placenta

د) Amniotic Band

✓ پاسخ: گزینه د

۳- مهارکننده بلوغ اووسیت (Inhibitor Maturation Oocyte) (در زمان جنینی، توسط کدام یک از ساختمان های زیر ترشح می شود؟

الف) Corpus Luteum د) Follicular Cells ج) Germinal Epithelium ب) Zona Pellucida

✓ پاسخ: گزینه ج

۴- لایه احشایی مزودرم خارج رویانی (Visceral) (در اطراف کدام یک از ساختمان های زیر دیده می شود؟
الف) کیسه زرده ب) کیسه آمنیون ج) حفره کوریون د) اطراف سیتوتروفوبلاست

✓ پاسخ: گزینه الف

۵- آلانتوئیس (Allantois) (از کدام یک از ساختمان های زیر منشاء می گیرد؟
الف) Umbilical Cord د) Prechordal Plate ج) Yolk Sac ب) Chorionic Plate

✓ پاسخ: گزینه ب

۶- بین دو لایه احشایی و جداری مزودرم داخل رویانی، کدام یک از ساختمان های زیر تشکیل می شود
الف) Chorionic Cavity

ب) Intraembryonic cavity

ج) Intermediate mesoderm

د) Dermomyotom

✓ پاسخ: گزینه ب

۷- الگوی شکل گیری عضلات، تحت تأثیر کدام مورد زیر است؟

الف) نحوه مهاجرت سلول های ستیغ عصبی

ب) ترتیب به هم پیوست میوبلاست ها

ج) بافت همبند مشتق از سومیت ها و ستیغ عصبی

د) استخوان های اطراف عضله

✓ پاسخ: گزینه ج

۸- کدام یک از ساختارهای زیر شاخ قدامی نخاع را ایجاد می کند؟

الف) صفحه سقفی

ب) صفحه کفی

ج) صفحه ای قاعده ای

د) صفحه بالی

✓ پاسخ: گزینه ج

۹- خون رسانی بخش شکم پیشین روده از کدام شریان است؟

الف) مزانتریک فوقانی ب) مزانتریک تحتانی ج) تنه سلیاک د) فرنیک تحتانی

✓ پاسخ: گزینه ج

۱۰- در صورتی که سیتوم آئورتیکوپولموناری به صورت مارپیچ تشکیل نشود، کدام ناهنجاری مادرزادی ایجاد می گردد؟ الف) تترالوژی فالو

ب) جابه جا شدن عروق بزرگ

ج) آترزی دریچه ریوی

د) باقی ماندن تنه شریانی

✓ پاسخ: گزینه ب

۱۱- کدام شریان از سومین قوس آئورتی منشاء می گیرد؟

الف) تنه ریوی

ب) سابکلارین راست

ج) ماگزیلاری

د) کاروتید مشترک

✓ پاسخ: گزینه د

۱۲- در هفته پنجم زندگی داخل رحمی، کدام ساختار در ضخامت مزوگاستر پشتی تکامل می یابد؟

الف) طحال

ب) کبد

ج) پانکراس

د) کیسه صفرا

✓ پاسخ: گزینه الف

۱۳- کدام یک از موارد زیر از ابتدای پیشین روده در هفته چهارم زندگی داخل رحمی منشاء می گیرد؟

الف) جوانه کبدی

ب) جوانه کیسه صفرا

ج) جوانه پانکراتیک شکمی

د) جوانه ریوی

✓ پاسخ: گزینه د

۱۴- در زمان لانه گزینی، رحم در کدام فاز زیر است؟

الف) Proliferative ب) Secretory ج) Menstrual د) Follicular

✓ پاسخ: گزینه ب

۱۵- در طی دومین ماه رشد جنین در داخل رحم، سن رویان براساس کدام یک از معیارهای زیر سنجیده می شود؟

الف) Crown Rump length

ب) Crown Heel length

ج) Weight of embryo

د) Number of domites

✓ پاسخ: گزینه الف

۱۶- باقی ماندن شیار اولیه (Streak Primitive) (پس از تولد، منجر به کدام یک از ناهنجاری های زیر می شود؟

الف) Dysgenesis Caudal

ب) Situs Inversus

ج) Coccygeal Teratoma

Δ) Kartagener Syndrom

✓ پاسخ: گزینه ج

۱۷- لوله های اپی ژنیتال ع^۱ژ^۲پس^۳پ^۴ژ^۵چ^۶س^۷ژ^۸ژ^۹ژ^{۱۰}ژ^{۱۱}ژ^{۱۲}ژ^{۱۳}ژ^{۱۴}ژ^{۱۵}ژ^{۱۶}ژ^{۱۷}ژ^{۱۸}ژ^{۱۹}ژ^{۲۰}ژ^{۲۱}ژ^{۲۲}ژ^{۲۳}ژ^{۲۴}ژ^{۲۵}ژ^{۲۶}ژ^{۲۷}ژ^{۲۸}ژ^{۲۹}ژ^{۳۰}ژ^{۳۱}ژ^{۳۲}ژ^{۳۳}ژ^{۳۴}ژ^{۳۵}ژ^{۳۶}ژ^{۳۷}ژ^{۳۸}ژ^{۳۹}ژ^{۴۰}ژ^{۴۱}ژ^{۴۲}ژ^{۴۳}ژ^{۴۴}ژ^{۴۵}ژ^{۴۶}ژ^{۴۷}ژ^{۴۸}ژ^{۴۹}ژ^{۵۰}ژ^{۵۱}ژ^{۵۲}ژ^{۵۳}ژ^{۵۴}ژ^{۵۵}ژ^{۵۶}ژ^{۵۷}ژ^{۵۸}ژ^{۵۹}ژ^{۶۰}ژ^{۶۱}ژ^{۶۲}ژ^{۶۳}ژ^{۶۴}ژ^{۶۵}ژ^{۶۶}ژ^{۶۷}ژ^{۶۸}ژ^{۶۹}ژ^{۷۰}ژ^{۷۱}ژ^{۷۲}ژ^{۷۳}ژ^{۷۴}ژ^{۷۵}ژ^{۷۶}ژ^{۷۷}ژ^{۷۸}ژ^{۷۹}ژ^{۸۰}ژ^{۸۱}ژ^{۸۲}ژ^{۸۳}ژ^{۸۴}ژ^{۸۵}ژ^{۸۶}ژ^{۸۷}ژ^{۸۸}ژ^{۸۹}ژ^{۹۰}ژ^{۹۱}ژ^{۹۲}ژ^{۹۳}ژ^{۹۴}ژ^{۹۵}ژ^{۹۶}ژ^{۹۷}ژ^{۹۸}ژ^{۹۹}ژ^{۱۰۰}ژ^{۱۰۱}ژ^{۱۰۲}ژ^{۱۰۳}ژ^{۱۰۴}ژ^{۱۰۵}ژ^{۱۰۶}ژ^{۱۰۷}ژ^{۱۰۸}ژ^{۱۰۹}ژ^{۱۱۰}ژ^{۱۱۱}ژ^{۱۱۲}ژ^{۱۱۳}ژ^{۱۱۴}ژ^{۱۱۵}ژ^{۱۱۶}ژ^{۱۱۷}ژ^{۱۱۸}ژ^{۱۱۹}ژ^{۱۲۰}ژ^{۱۲۱}ژ^{۱۲۲}ژ^{۱۲۳}ژ^{۱۲۴}ژ^{۱۲۵}ژ^{۱۲۶}ژ^{۱۲۷}ژ^{۱۲۸}ژ^{۱۲۹}ژ^{۱۳۰}ژ^{۱۳۱}ژ^{۱۳۲}ژ^{۱۳۳}ژ^{۱۳۴}ژ^{۱۳۵}ژ^{۱۳۶}ژ^{۱۳۷}ژ^{۱۳۸}ژ^{۱۳۹}ژ^{۱۴۰}ژ^{۱۴۱}ژ^{۱۴۲}ژ^{۱۴۳}ژ^{۱۴۴}ژ^{۱۴۵}ژ^{۱۴۶}ژ^{۱۴۷}ژ^{۱۴۸}ژ^{۱۴۹}ژ^{۱۵۰}ژ^{۱۵۱}ژ^{۱۵۲}ژ^{۱۵۳}ژ^{۱۵۴}ژ^{۱۵۵}ژ^{۱۵۶}ژ^{۱۵۷}ژ^{۱۵۸}ژ^{۱۵۹}ژ^{۱۶۰}ژ^{۱۶۱}ژ^{۱۶۲}ژ^{۱۶۳}ژ^{۱۶۴}ژ^{۱۶۵}ژ^{۱۶۶}ژ^{۱۶۷}ژ^{۱۶۸}ژ^{۱۶۹}ژ^{۱۷۰}ژ^{۱۷۱}ژ^{۱۷۲}ژ^{۱۷۳}ژ^{۱۷۴}ژ^{۱۷۵}ژ^{۱۷۶}ژ^{۱۷۷}ژ^{۱۷۸}ژ^{۱۷۹}ژ^{۱۸۰}ژ^{۱۸۱}ژ^{۱۸۲}ژ^{۱۸۳}ژ^{۱۸۴}ژ^{۱۸۵}ژ^{۱۸۶}ژ^{۱۸۷}ژ^{۱۸۸}ژ^{۱۸۹}ژ^{۱۹۰}ژ^{۱۹۱}ژ^{۱۹۲}ژ^{۱۹۳}ژ^{۱۹۴}ژ^{۱۹۵}ژ^{۱۹۶}ژ^{۱۹۷}ژ^{۱۹۸}ژ^{۱۹۹}ژ^{۲۰۰}ژ^{۲۰۱}ژ^{۲۰۲}ژ^{۲۰۳}ژ^{۲۰۴}ژ^{۲۰۵}ژ^{۲۰۶}ژ^{۲۰۷}ژ^{۲۰۸}ژ^{۲۰۹}ژ^{۲۱۰}ژ^{۲۱۱}ژ^{۲۱۲}ژ^{۲۱۳}ژ^{۲۱۴}ژ^{۲۱۵}ژ^{۲۱۶}ژ^{۲۱۷}ژ^{۲۱۸}ژ^{۲۱۹}ژ^{۲۲۰}ژ^{۲۲۱}ژ^{۲۲۲}ژ^{۲۲۳}ژ^{۲۲۴}ژ^{۲۲۵}ژ^{۲۲۶}ژ^{۲۲۷}ژ^{۲۲۸}ژ^{۲۲۹}ژ^{۲۳۰}ژ^{۲۳۱}ژ^{۲۳۲}ژ^{۲۳۳}ژ^{۲۳۴}ژ^{۲۳۵}ژ^{۲۳۶}ژ^{۲۳۷}ژ^{۲۳۸}ژ^{۲۳۹}ژ^{۲۴۰}ژ^{۲۴۱}ژ^{۲۴۲}ژ^{۲۴۳}ژ^{۲۴۴}ژ^{۲۴۵}ژ^{۲۴۶}ژ^{۲۴۷}ژ^{۲۴۸}ژ^{۲۴۹}ژ^{۲۵۰}ژ^{۲۵۱}ژ^{۲۵۲}ژ^{۲۵۳}ژ^{۲۵۴}ژ^{۲۵۵}ژ^{۲۵۶}ژ^{۲۵۷}ژ^{۲۵۸}ژ^{۲۵۹}ژ^{۲۶۰}ژ^{۲۶۱}ژ^{۲۶۲}ژ^{۲۶۳}ژ^{۲۶۴}ژ^{۲۶۵}ژ^{۲۶۶}ژ^{۲۶۷}ژ^{۲۶۸}ژ^{۲۶۹}ژ^{۲۷۰}ژ^{۲۷۱}ژ^{۲۷۲}ژ^{۲۷۳}ژ^{۲۷۴}ژ^{۲۷۵}ژ^{۲۷۶}ژ^{۲۷۷}ژ^{۲۷۸}ژ^{۲۷۹}ژ^{۲۸۰}ژ^{۲۸۱}ژ^{۲۸۲}ژ^{۲۸۳}ژ^{۲۸۴}ژ^{۲۸۵}ژ^{۲۸۶}ژ^{۲۸۷}ژ^{۲۸۸}ژ^{۲۸۹}ژ^{۲۹۰}ژ^{۲۹۱}ژ^{۲۹۲}ژ^{۲۹۳}ژ^{۲۹۴}ژ^{۲۹۵}ژ^{۲۹۶}ژ^{۲۹۷}ژ^{۲۹۸}ژ^{۲۹۹}ژ^{۳۰۰}ژ^{۳۰۱}ژ^{۳۰۲}ژ^{۳۰۳}ژ^{۳۰۴}ژ^{۳۰۵}ژ^{۳۰۶}ژ^{۳۰۷}ژ^{۳۰۸}ژ^{۳۰۹}ژ^{۳۱۰}ژ^{۳۱۱}ژ^{۳۱۲}ژ^{۳۱۳}ژ^{۳۱۴}ژ^{۳۱۵}ژ^{۳۱۶}ژ^{۳۱۷}ژ^{۳۱۸}ژ^{۳۱۹}ژ^{۳۲۰}ژ^{۳۲۱}ژ^{۳۲۲}ژ^{۳۲۳}ژ^{۳۲۴}ژ^{۳۲۵}ژ^{۳۲۶}ژ^{۳۲۷}ژ^{۳۲۸}ژ^{۳۲۹}ژ^{۳۳۰}ژ^۳

الف) مجاری و ابران ب) اپیدیدیم ج) شبکه بیضه د) مجرای انزالی

پاسخ، گزینه الف

۱۸- در صورتی که کلیه از بین سرخرگ های نافی نتواند عبور کند و نزدیک به سرخرگ ایلیاک مشترک باقی بماند چه نوع کلیه

ای را ایجاد می کند

الف) نعل اسبی ب) لگنی ج) نافی د) تحلیل رفته

☒ پاسخ: گزینه ب

۱۹- پرزهای اولیه در حین تکامل جفت در کدام هفته تشکیل می شوند؟

الف) اول ب) دوم ج) سوم د) چهارم

پاسخ، گزینه ب

۲۰- ریپنرچ ژیریرڈ ۽ ریچرڈ ۽ منشاء کدام یک از استخوان های مجمله است ۰

الفظ رچسٽر ٿيڊ بظ ٻڙ ٿڊ ٻرچ حظ رچسٽر ٿڙ ڌظ ٻٿر ٻٿر

☒ پاسخ: گزینه الف

داخلی جراحی

۱) همه موارد درباره اداره آسم در بارداری صحیح است بجز

الف) در آسم خفیف تجویز بتا آگونیست کفایت می‌کند

ب) در آسم پابرجا کورتیکواستروئید استنشاقی لازم است

ج) تجویز کور تیکواستروئید^۱ در لیبر ممنوع است

د) در تسکین درد لیبر فنتانیل به میردین ارجح است

☒ پاسخ: گزینه ج

۲) بر اساس دستورالعمل کشوری همه گزینه ها درباره امتیاز دهی عوامل خطر پیشگیری از ترومبوز آمبولی وریدی صحیح است؛

بجزء

الف) امتیاز ژ و بیشتر در بارداری نیاز به شروع ضد انعقاد از هفته ژ بارداری دارد

ب) امتیاز د در یارداری نیاز به شروع ضد انعقاد از هفته ۳ بارداری دارد

ج) ارزیابی عوامل خطر یک بار قبل، یکبار حین بارداری و در هر بار پذیرش بیمارستانی لازم است.

د) سابقه ترومبوفیلی و تحریک بیش از حد تخمدان هر یک امتیاز کسب می کنند

☒ پاسخ: گزینه الف

- ۳) خانمی مبتلا به ادم کاردیوژنیک هیدروستاتیک است. کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
الف) زایمان سزارین الزامی است ب) تجویز داروهای کاردیوژنیک توصیه می شود.
ج) فوروزماید ۲۰-۴۰ میلی گرم وریدی داده می شود.
د) نارسایی دهلیزی منجر به ادم ریه در بارداری است.

✓ پاسخ: گزینه ج

- ۴) کدام یک از موارد زیر در خصوص پیلونفریت حاد بارداری صحیح است؟
الف) درد حاد متناوب در هر دو ناحیه کمری رخ می دهد.
ب) از علل اصلی شوک در دوران بارداری است
ج) از عوارض نامعمول بارداری است
د) تب و لرزهای دیررس رخ می دهد.

✓ پاسخ: گزینه ب

- ۵) کدام یک از موارد زیر در مورد تغییرات کلیه در بارداری صحیح است؟
الف) اندازه کلیه حدود ۳ سانتی متر افزایش می یابد
ب) کلیرانس کراتینین کاهش می یابد
ج) آستانه بی کربنات کلیه کاهش می یابد.
د) میزان دفع ادراری اسیدهای آمینه افزایش می یابد.

✓ پاسخ: گزینه ج و د

- ۶) درباره لوپوس در بارداری همه گزینه ها صحیح است بجز:
الف) اغلب نوزادان دچار لوپوس جلدی پایدار می شوند ب) عوارض جنینی ناشی از واسکولوپاتی دسیدوا است
ج) آزاتیوپرین در نفريت لوپوسی توصیه می شود. د) پردنیزون خوراکی در موارد شدید توصیه می شود.

✓ پاسخ: گزینه الف

- ۷) کدام یک از موارد زیر در مورد هیپرتانسیون ریوی در بارداری صحیح است؟
الف) هیپرتانسیون ریوی ناشی از بیماری های ریوی بدترین پروگنوز را دارد.
ب) در رادیوگرافی قفسه سینه تنگی شرایین ناف ریه دیده می شود..
ج) پرهیز از قرار گرفتن به وضعیت خوابیده به پشت توصیه می شود.
د) اکسیدنیتریک استنشاقی در موارد اختلال مزمن قلبی استفاده شود.

✓ پاسخ: گزینه ج

- ۸) مطابق دستورالعمل کشوری مادری ایمن در صورت مراجعه زن باردار با حمله میگرن یک ماما چه اقدامی را قبل از ارجاع به متخصص باید انجام دهد؟

- الف) تجویز عضلانی آمپول ۲۵ میلی گرم پرومتازین و قرص یا شیاف استامینوفن
ب) تجویز عضلانی آمپول ۵۰ میلی گرم پرومتازین و قرص یا شیاف استامینوفن
ج) تجویز قرص یا شیاف استامینوفن
د) ارجاع فوری به متخصص

✓ پاسخ: گزینه الف

۹) همه موارد در رابطه با پیامد دیابت بارداری صحیح است بجز:

الف) هیپرتانسیون و سزارین افزایش می یابد ب) میزان ناهنجاری جنین به طور چشمگیری افزایش می یابد. ج) مرده زایی غیرقابل توجهی افزایش می یابد. د) ماکروزومی پیامد اصلی محسوب می شود.

✓ پاسخ: گزینه ب

۱۰) در خانم باردار با BMI=۳۰ خطر نسبی (OR) کدام یک از عوارض بیشتر است؟

الف) دیابت بارداری ب) ماکروزومی ج) دیستوشی شانه د) زایمان پره ترم

✓ پاسخ: گزینه الف

۱۱) خانم ۳۱ ساله ۲L۲P۳G مبتلا به بیماری قلبی در جریان لیبر قرار داشته و در خواست عقیم سازی هم دارد. کدام گزینه برای وی توصیه نمی شود؟

الف) سزارین الکتیو و عقیم سازی همزمان ب) زایمان واژینال و به تاخیر انداختن عقیم سازی ج) در طول لیبر در وضعیت خوابیده به پهلو قرار بگیرد د) درد مادر با بی دردی اپیدورال مداوم تسکین یابد

✓ پاسخ: گزینه الف

۱۲) خانم بارداری که در معرض سرب قرار دارد میزان سرب خون ۶ میکروگرم در دسی لیتر گزارش شده است. کدام اقدام صحیح است؟

الف) انجام مشاوره و ختم بارداری

ب) مشاوره حذف منبع ویروسی مجدد میزان سرب خون

ج) حذف منبع-انجام درمان سرب زدایی

د) انجام درمان سرب زدایی و اندازه گیری مجدد سرب خون

✓ پاسخ: گزینه ب

۱۳) کدام گزینه در رابطه با اختلالات هماتولوژیک در بارداری صحیح است؟

الف) زنان مبتلا به تالاسمی مینور نیازی به مصرف آهن و اسید فولیک ندارند.

ب) در تالاسمی ماژور با ترانسفوزیون مکرر خون هموگلوبین بالای ۱۰ dl/mg نگه داشته شود.

ج) ترومبوسیتوپنی بارداری در اثر کوتاه شدن عمر پلاکت معمول است.

د) در اغلب مبتلایان ترومبوسیتوپنی سرولوژی لوپوسی مثبت است.

✓ پاسخ: گزینه ب

۱۴) درباره تیروئیدیت بعد از زایمان کدام عبارت صحیح است؟

الف) در زنان با سابقه آنتی بادی تیروئیدی در بارداری احتمال آن نادر است.

ب) شکایت اصلی زنان در شروع بیماری خستگی و تپش قلب است.

ج) معمولاً به شکل هیپوتیروئیدی خود را نشان می دهد.

د) اغلب در ماه های اول بعد از زایمان رخ می دهد.

✓ پاسخ: گزینه ب

۱۵) کدام یک از موارد زیر در مورد سقط صحیح است؟

الف) سقط های یوپلوئید زودتر از سقط های آنوپلوئید رخ می دهد

ب) میزان سقط آنوپلوئید تقریباً در هفته ۱۳ حاملگی به حداکثر می رسد.

ج) مونوزومی شایعترین اختلال کروموزوم منفرد محسوب می شود.

د) سن بالای مادر میزان بروز سقط تریپلوئیدی را افزایش می دهد.

✓ پاسخ: گزینه ج

۱۶) بیشترین درصد عوارض در نوزادان مادران مبتلا به فنیل کتونوری درمان نشده، کدام یک از موارد زیر است؟
الف) سقط خود به خود ب) عقب ماندگی ذهنی و تکاملی ج) میکروسفالی د) محدودیت رشد جنینی

✓ پاسخ: گزینه ب

۱۷) خانمی مبتلا به استفراغ شدید بارداری است. کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف) مذکر بودن جنین خطر آن را افزایش می دهد

ب) درمان با گلوکوکورتیکوئید ها شروع شود.

ج) در صورت تداوم استفراغ بعد از درمان تغذیه انترال شروع شود.

د) ویتامین K برای پیشگیری از آنسفالوپاتی ورنیکه تجویز می شود.

✓ پاسخ: گزینه ج

۱۸) برای خانمی مبتلا به دیابت بارداری که به طور الکتیو جهت زایمان بستری شده است. کدام اقدام در جریان لیبر صحیح است؟

الف) شروع انفوزیون دکستروز از ابتدای بستری

ب) حذف دوز صبحگاهی انسولین

ج) تجویز انسولین رگولار در صورت گلوکز بالاتر از $mg/200dl$

د) ارزیابی سطح گلوکز خون هر یک ساعت در آزمایشگاه

✓ پاسخ: گزینه ب

۱۹) کدام گزینه درباره پیامد های بارداری در زنان مبتلا به فشار خون مزمن صحیح است؟

الف) تشدید فشارخون در سراسر بارداری ب) افزایش حجم داخل عروقی

ج) افزایش ۵-۶ برابری در دکولمان د) افزایش خطر نقایص قلبی جنینی

✓ پاسخ: گزینه د

روانپزشکی در مامایی

۱- خانومی به دلیل دیسپارونیا ناشی از یائسگی مراجعه کرده است. طبق مدل PLISSIT اولین مرحله برای مشاوره چیست؟

الف) بیان این که دیسپارونیا در زنان منوپوز شایع است

ب) مکانیسم درد برای او توضیح داده شود

ج) نقش هورمون ها در یائسگی توضیح داده شود.

د) ارجاع برای درمان فشرده انجام شود.

✓ پاسخ: : گزینه الف

۲- کدامیک از موارد زیر در مورد تمنای جنسی صحیح است؟

الف) تمنای جنسی قویا تحت تاثیر خستگی قرار میگیرد

ب) پرولاکتین پاسخ سکسوال را برمی انگیزد

ج) نور اپی نفرین پاسخ سکسوال را مهار میکند

د) فاکتورهای بیولوژیک مستقل از فاکتورهای محیطی عمل میکنند

✓ پاسخ: : گزینه الف

۳- بهترین پیش بینی کننده تمنای جنسی کدام یک از موارد زیر است؟

الف) ارتباطی

ب) شناختی

ج) طبی

د) سایکوپاتولوژی

✓ پاسخ: ب گزینه ب

۴- واژینیسموس انقباضات غیراردی کدام قسمت واژن میباشد؟

الف) یک سوم خارجی

ب) دو سوم خارجی

ج) یک سوم داخلی

د) دو سوم داخلی

✓ پاسخ: الف گزینه الف

۵- همه موارد زیر در مورد دیسپارونی صحیح است بجز:

الف) معمولا این اختلال همراه با واژینیسموس می باشد

ب) علل عضوی آن باید رد شود

ج) در اکثر موارد عوامل دینامیک عامل سببی محسوب می شود

د) بلافاصله پس از یائسگی افزایش و ادامه می یابد

✓ پاسخ: د گزینه د

۶- از نظر پیازه علت گوش نکردن کودک چهار ساله به این سخن مادرش چیست؟

ا) ساکت باش چون برادرت درس دارد

الف) تفکر جادویی

ب) خودمحوری

ج) بازگشت پذیری

د) کارکرد نشانه ای

✓ پاسخ: ب گزینه ب

۷- در نظریه دلبستگی از دیدگاه اینزورت موارد زیر از پیامدهای دلبستگی ایمن کودک به مادر است؟ بجز

الف) کاهش اضطراب

ب) وابستگی به مادر

ج) توانایی کاوش محیط

د) توانایی دل کردن از دلبسته ها

✓ پاسخ: د گزینه د

۸- بیماری با اختلال استرس پس از سانحه به دنبال خرابی خانه اش پس از وقوع سیل با شنیدن صدای آب منظره ی وحشت

زدگی سیل برای او تداعی میشود کدامیک از انواع شرطی سازی ها علت ترس او را تبیین می کند

الف) کلاسیک

ب) عامل

ج) تقابلی

د) خاموشی سازی

✓ پاسخ: الف

۹- کدامیک از موارد زیر در درمانگر به بیمار شرح میدهد که باید اطلاعات جلسه مشاوره را با مسئولین قانونی در میان بگذارد؟

الف) سالمند آزاری

ب) خیانت به همسر

ج) تجاوز جنسی

د) همسر آزاری

✓ پاسخ: ج

۱۰- در فرایند مصاحبه با مراجع در هنگام مرور روانپزشکی سیستم ها کدامیک از علائم زیر می تواند احتمال روانپریشی یا سایکوز فرد را مطرح کند؟

الف) ترس از ارتفاع و هواپیما

ب) کاهش نیاز به خواب و بولخرجی

ج) شنیدن صدای اموات و گفتگو با آن

د) کابوس شبانه و از جا پریدن

✓ پاسخ: ج

۱۱- دانشجویی از پرسیدن سوال از استاد خود به علت ترس از مسخره و یا تحقیر شدن پرهیز می کند کدامیک از اختلالات

اضطرابی برای وی مطرح است؟

الف) وحشت زدگی

ب) جمع هراسی

ج) هراس اجتماعی

د) بازار هراسی

✓ پاسخ: ب

۱۲- در مصاحبه بالینی خانمی، علائم بی ثباتی هیجانی، بیش واکنش دهی، توجه طلبی و اغواگری مشاهده میشود. کدام یک از اختلالات شخصیت برای وی مطرح است؟

الف) مرزی

ب) نمایشی

ج) خود شیفته

د) ضد اجتماعی

✓ پاسخ: ب

۱۳- کودک پنج ساله ای ترجیح قوی برای استفاده از اسباب بازی های مرتبط با جنس دیگر دارد و هم بازی های جنس مخالف دارد و لباس جنس مقابل را ترجیح می دهد. کدامیک از اختلالات زیر، محتمل ترین تشخیص وی است؟ الف) مبدلپوشی

ب) سندرم ترنر

ج) هیپرپلازی آدرنال

د) نارسایی جنسیتی

✓ پاسخ: د

۱۴- بیماری به علت خونریزی شدید پس از زایمان به اورژانس مراجعه کرده است. طبق شرح حال مشخص شده است که از چند ساعت قبل دچار بی قراری و اختلال در حافظه شده است. وقتی از بیمار پرسیده شد اینجا کجاست؟ پاسخ می دهد که اینجا سینما است. محتملترین تشخیص کدام است؟

الف) اسکیزوفرنی

ب) دلیریوم

ج) آلزایمر

د) دمانس عروقی

☒ پاسخ: گزینه ب

۱۵- خانمی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته است همسرش را جهت ارزیابی به اورژانس آورده است و از شما می خواهد که به او کمک کنید. همه اقدامات زیر در رابطه با همسر خشونت ورز او صحیح است، بجز الف) قبل از ملاقات با او، حتی الامکان بهخوبی او را بشناسید.

ب) نسبت به خطرات خشونت قریب الوقوع هشیار باشید.

ج) اگر وی تهدید می کند، به گونهای او را تهدید کنید که خشونت نرزد.

د) گروهی را جهت مهار فیزیکی آماده داشته باشید

☒ پاسخ: گزینه ج

۱۶- در بررسی سونوگرافی خانمی باردار جنین ۲۸ هفته مرده تشخیص داده شده است- پزشک توصیه به ختم حاملگی نموده است- خانم اصرار می کند که می خواهد فرزندش را نگه دارد- زیرا وی زنده است- کدامیک از واکنش های داغ دیدگی برای وی مطرح است؟

الف) کناره گیری اجتماعی

ب) شوک و ناباروری

ج) سازمان دهی مجدد

د) ناراحتی حاد

☒ پاسخ: گزینه ب

۱۷- در شرح حال خانم بارداری داروهای زیر مصرف می شود- با توجه به خطرات مصرف دارو در حاملگی- قطع کدام دارو در اولویت پزشک خواهد بود؟

الف) استامینوفن

ب) آسپرین

ج) لیتیوم

د) اسید والپرویک

☒ پاسخ: گزینه د

۱۸- سابقه ابتلا به کدامیک از اختلالات روانپزشکی- شانس خطر بروز استفراغ مفرط حاملگی را افزایش می دهد

الف) پراشتهایی عصبی

ب) هرزه خواری

ج) اختلال ارگاسم

د) پارافیلیا

☒ پاسخ: گزینه الف

۱۹- سابقه ابتلا به کدامیک از اختلالات خطر بروز افسردگی اساسی را در خانم جوان افزایش می دهد

الف) افسردگی پس از زایمان

ب) اضطراب پس از زایمان

ج) اندوه بچه

د) دمانس

✓ پاسخ: الف گزینه الف

۲۰- همه موارد زیر در مورد ناتوانی جنسی زنان احتمالا تاثیر دارد؛ بجز

الف) کم کاری تیروئید

ب) دیابت ملیتوس

ج) کاهش اولیه پرولاکتین

د) داروهای فشار خون

✓ پاسخ: ج گزینه ج